



## こどもの予防接種スケジュール

ワクチン名	接種期間	注意事項
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	①-②-③の間はそれぞれ4~8週あける。 ③-④は7~13ヵ月あける。	生後2ヵ月~5歳の誕生日前日まで。 初回の接種月齢・年齢によって接種間隔・回数 が異なります。
肺炎球菌 (PCV13)	①-②-③の間はそれぞれ4週以上あける。 ③-④は2ヵ月以上あけ、かつ1歳~1 歳3ヵ月の間に④を接種する。	生後2ヵ月~5歳の誕生日前日まで。 5歳~6歳未満の間に任意で追加接種が可能。
B型肝炎 (母子感染予防を除く)	①生後2ヵ月 ②生後3ヵ月 ③生後7~8ヵ月 ①-②は4週、①-③は20週以上あける。	1歳以上でも未接種の場合は早めに接種すること を推奨。 母親が妊娠中にB型肝炎のキャリアであること が分かった場合は、かかりつけの医療機関の指 示に従う。
ロタウイルス	生後6週から接種可能、①は8~15週 未満を推奨 ・1価ワクチン：①-②は4週以上あける ・5価ワクチン：①-②-③は4週以上あける	・1価ワクチン：生後24週までに完了すること ・5価ワクチン：生後32週までに完了すること
四種混合 (DPT-IPV：ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)	①-②-③の間はそれぞれ3-8週あける。 ③-④は6ヵ月以上あける。 (標準的に③終了後12~18ヵ月の 間)	11歳~13歳未満に追加接種として二種混合ワ クチンを1回接種

ワクチン名	接種期間	注意事項
BCG	12ヵ月未満に接種 標準的には5~8ヵ月未満	
麻疹・風疹 (MR)	①1歳以上2歳未満 ②5歳以上7歳未満 (小学校入学前の1年間)	麻疹曝露後や流行地域では麻疹ワクチンを生 後6ヵ月以降で接種可能。その場合接種回数に は数えず、①・②は規定通り接種する。
水痘(みずぼうそう)	①生後12~15ヵ月 ①-②は3ヵ月以上あける	
おたふくかぜ	①1歳以上 ②5歳~7歳未満(小学校入学前の1年 前)	予防効果を確実にするために2回接種が必要で ある。
日本脳炎	①-②は3歳のうちに6~28日あける。 ③は①から1年あける。 ④9~12歳	・生後6ヵ月から接種できるが、標準的には3歳 から。 ・2007年4月2日から2009年10月1日生ま れのはととは生後6ヵ月-7歳6ヵ月未満または9歳 -13歳未満の間に第1期の接種が可能。 ・2005年5月からの積極的推奨の差し控えを 受け、1995年4月2日から2007年4月1日生 まれの特定期間対象者は、20歳未満までは定期接種 可能。
インフルエンザ	①-②は4週(2-4週あける)	13歳未満：2回、13歳以上：1回または2回